

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
НИРКОВИЙ ЧАЙ
(ORTHOSIPHONIS STAMINEI FOLIA)

Склад:

діюча речовина: ортосифону тичинкового листя (*Orthosiphonis staminei folia*);

1 пачка містить: ортосифону тичинкового листя (*Orthosiphonis staminei folia*) 50 г ;

1 фільтр-пакет містить: ортосифону тичинкового листя (*Orthosiphonis staminei folia*) 1,5 г.

Лікарська форма. Листя.

Основні фізико-хімічні властивості: шматочки листя і стебел різної форми зеленого, сірувато-зеленого, зеленувато-коричневого, фіолетово-бурого або фіолетово-коричневого кольору з крапліннями жовтувато-білого кольору.

Фармакотерапевтична група. Рослинні засоби з діуретичним ефектом . Код АТХ C03B X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини листя чинять діуретичну, спазмолітичну і жовчогінну дію; підвищують секрецію шлункового соку, збільшують у ньому вміст вільної соляної кислоти, виводять з організму сечовину, сечову кислоту, хлориди.

Клінічні характеристики.

Показання.

Гострі та хронічні захворювання нирок, холецистити; набряки, спричинені порушеною функцією нирок або серцевою недостатністю (у складі комплексної терапії).

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату; гіперацидний гастрит, виразкова хвороба .

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю. За призначенням лікаря, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини .

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

1 десертну ложку листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплого вигляді 2 рази на добу за 20-30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по ½склянки; дітям віком 12-14 років – по ½ склянки, 7-12 років – по 1 столовій ложці, 3-7 років – по 1 десертній ложці. При холециститах застосовувати після їди. Перед прийомом настій збовтати. 2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплого вигляді 2 рази на добу за 20-30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по ½склянки, дітям віком 12-14 років – по ½ склянки, 7-12 років – по 1 столовій ложці, 3-7 років – по 1 десертній ложці. При холециститах застосовувати після їди. Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8 -15 °С не більше 2 діб. Тривалість лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.

Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.

Передозування. При передозуванні можливий біль у ділянці нирок, печінки, шлунка.

Побічні реакції.

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності. 4 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник. ПрАТ «Ліктрави», Україна.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місцезнахо-дження заявника.
Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.