

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЦИНКОВА МАЗЬ
(ZINCOINTMENT)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 г мазі містить цинку оксиду 0,1 г;
допоміжна речовина: парафін білий м'який.

Лікарська форма. Мазь 10 %.

Мазь білого або білого з жовтим відтінком кольору. За зовнішнім виглядом мазь повинна бути однорідною.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «Тернофарм».
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.
Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>.

Фармакотерапевтична група. Препарати з пом'якшувальною і захисною дією.
Код АТС D02A B.

Цинкова мазь чинить в'яжучу, адсорбуючу, антисептичну дію, зменшує виразність ексудативних процесів.
При місцевому застосуванні зменшує прояви запалення та подразнення шкіри, пом'якшує та підсушує її.
При зовнішньому застосуванні цинкова мазь практично не адсорбується у системний кровотік і не проявляє резорбтивної дії.

Показання для застосування.

Лікування і профілактика пелюшкового дерматиту. Лікування дерматитів, екземи, попірлостей, ушкоджень шкіри (невеликі термічні і сонячні опіки, порізи, подряпини).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Гнійно-запальні захворювання шкіри та прилеглих тканин.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Мазь призначена тільки для зовнішнього застосування. Не застосовувати при гнійничкових хворобах шкіри.
Мазь наносити тільки на неінфіковані ділянки шкіри.
Не допускати попадання мазі на слизові оболонки та в очі. У випадку попадання мазі в очі слід промити їх великою кількістю проточної води та звернутися до лікаря.
Якщо пелюшковий висип у дитини не зникає протягом 7 днів від початку застосування препарату, необхідно припинити лікування і звернутися за повторною консультацією до лікаря.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.
Застосування препарату у період вагітності або годування груддю можливе тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами та роботу з іншими механізмами.

Діти.

Препарат можна застосовувати у педіатричній практиці.

Спосіб застосування та дози.

Пелюшковий дерматит у дітей
З метою профілактики мазь наносити на чисту та суху шкіру (під пелюшки), особливо перед сном, для запобігання виникненню подразнення шкіри через тривалий контакт з мокрим пелюшками.
З лікувальною метою мазь наносити на шкіру тонким шаром тричі на добу (у разі необхідності – під час кожної зміни пелюшок) при появі перших ознак гіперемії (почервоніння шкіри), попірлості або незначного подразнення шкіри.
Дерматити, екзема, термічні та сонячні опіки, порізи, подряпини, попірлості
Мазь наносити тонким шаром на уражену поверхню. У разі необхідності накладати марлеву пов'язку.
Термін лікування визначає лікар залежно від характеру та перебігу захворювання.

Передозування.

При місцевому застосуванні передозування малоімовірне. При випадковому прийомі внутрішньо у великих дозах можуть виникати біль у шлунку, нудота, блювання, діарея, стимуляція центральної нервової системи і судоми.

Побічні ефекти.

Реакції підвищеної чутливості до препарату, включаючи свербіж, гіперемію, висипання; зміни у місці нанесення мазі, лущення, біль, кропив'янка. При тривалому застосуванні можливе подразнення шкіри.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія не встановлена.

Термін придатності.

5 років.

Умови зберігання.

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 20 г у банках або по 20 г у тубах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.