

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЕЛЕУТЕРОКОКУ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ

Склад лікарського засобу :

діюча речовина: 1 флакон містить рідкого екстракту кореневищ та коренів елеутерококу (*Eleutherococci rhizomata et radices*) (1:1) (екстрагент – етанол 40 %) – 50 мл;
допоміжні речовини, крім екстрагенту, відсутні.

Лікарська форма. Екстракт рідкий.

Рідина темно-коричневого кольору, в тонкому шарі прозора, запах своєрідний, специфічний. В процесі зберігання можливе випадання осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «Тернофарм».
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Фармакотерапевтична група. Тонізуючі засоби.

Код АТС А13А.

До складу кореневищ з коренями елеутерококу входять елеутерозиди А, В, В₁, С, D, Е, F і G, похідні кумарину, флавоноїди, ефірна олія, рослинний віск, смоли, крохмаль та інші компоненти. Завдяки присутності елеутерозидів препарат підвищує фізичну та розумову працездатність, стійкість до несприятливих факторів навколишнього середовища, гостроту зору, покращує обмін речовин, чинить незначну стимулюючу гонадотропну та гіпоглікемічну дію.

Показання для застосування.

Фізична та розумова перевтома, неврастенії та психостенії, функціональне виснаження центральної нервової системи, яке супроводжується зниженням працездатності; дратівливістю і безсонням. Вегето-неврози, післяопераційний період; у поєднанні з іншими засобами – при гострій та хронічній променевій хворобі.

Протипоказання.

Гіперчутливість до компонентів препарату, гіпертермічний синдром, артеріальна гіпертензія, підвищена збудливість, епілепсія, гострі інфекційні захворювання, інфаркт міокарда, аритмії, безсоння, вегето-судинна дистонія.

Особливі застереження.

При тривалому зберіганні препарату допускається випадання осаду, тому перед застосуванням препарату флакон необхідно кілька разів збовтати. При застосуванні препарату необхідно контролювати артеріальний тиск. При прийомі препарату у другій половині дня можливе безсоння. Препарат малотоксичний, добре переноситься, у тому числі особами літнього віку і дітьми.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Оскільки препарат містить етанол, його не можна призначати вагітним та жінкам, які годують груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Препарат містить етанол 40 %, тому під час застосування препарату слід дотримуватися обережності при керуванні транспортними засобами або роботі з потенційно-небезпечними механізмами.

Діти.

Застосовувати за призначенням лікаря дітям віком від 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Перед застосуванням збовтати. Препарат застосовувати внутрішньо за 30 хвилин до їди. Дорослим приймати по 20-30 крапель 1 раз на день, дітям віком від 12 років призначати з розрахунку 1 крапля на 1 рік життя дитини 1 раз на день, попередньо розвівши невеликою кількістю води, у першу половину дня (тобто до 15 години). Курс лікування становить 25-30 днів; при необхідності – повторювати через 1-2 тижні.

Передозування.

Можливе підвищення артеріального тиску, порушення ритму серця, підвищена збудливість, порушення сну, порушення з боку травного тракту, знижується працездатність. У таких випадках слід негайно припинити застосування препарату та провести симптоматичну терапію.

Побічні ефекти.

Препарат, зазвичай, переноситься добре, проте у пацієнтів з гіперчутливістю до його компонентів можливий розвиток алергічних реакцій (почервоніння шкіри, висипання, свербіж).

З боку центральної нервової системи: головний біль, збудження, порушення сну, дратівливість, тривожний стан, зниження працездатності.

З боку серцево-судинної системи: тахікардія, підвищення артеріального тиску.

Тривале застосування (більше 2 місяців) може спричинити спазм м'язів, порушення з боку травного тракту.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат може потенціювати дію стимуляторів центральної нервової системи, аналептиків і гіпоглікемічних засобів, є фізіологічним антагоністом засобів, що пригнічують центральну нервову систему (у т.ч. барбітуратів, транквілізаторів, протиепілептичних засобів).

Термін придатності. 4 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C.
Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 50 мл у флаконах скляних або флаконах полімерних в пачці або без пачки.

Категорія відпуску. Без рецепта.