

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН З ГЛІЦЕРИНОМ

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г розчину містить: йоду - 0,01 г, калію йодиду - 0,02 г, гліцерину в перерахуванні на 100 % - 0,83 г;
допоміжні речовини: вода очищена.

Лікарська форма. Розчин для ротової порожнини.

Прозора сиропоподібна рідина червоно-бурого кольору із запахом йоду.

Назва і місце знаходження виробника.

ПАТ «Фітофарм».

Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

Фармакотерапевтична група.

Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики.

Код ATC R02A A20.

Люголя розчин з гліцерином чинить бактерицидну дію за рахунок вмісту в ньому вільного йоду. Препарат чинить протимікробну дію на грампозитивні та грамнегативні бактерії, у тому числі на стрептококи, стафілококи, кишкову паличку, клебсієли, вульгарний протей.

Показання для застосування.

Запальні захворювання слизових оболонок глотки та гортані: ларингіт, тонзиліт, фарингіт.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препаратору. Тяжкі захворювання печінки та нирок, виражена гіперфункція щитовидної залози, некомпенсирована серцева, ниркова або печінкова недостатність; дослідження або терапія радіоактивним йодом (за 2 тижні перед та після дослідження або терапії).

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат не призначений для прийому внутрішньо. Не слід вдихати та/або проковтювати препарат. Не допускати потрапляння препаратору в очі. З обережністю застосовувати при ларингіті через можливість ларингоспазму, при туберкульозі, гемрагічних діатезах.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат протипоказаний у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Не рекомендується застосовувати дітям віком до 5 років.

Способ застосування та дози.

Для зовнішнього застосування!

Тампоном, змоченим препаратором, змащувати уражені слизові оболонки глотки та гортані 3 – 4 рази на день.

Тривалість курсу лікування залежить від перебігу захворювання та його тяжкості.

Передозування.

Можливі появи йодизму: нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слізотеча, слиновиділення, висипи на шкірі, м'язова слабкість, загальмованість.

Лікування. Негайне припинення застосування препаратору та симптоматична терапія.

Побічні ефекти.

При тривалому застосування можуть з'явитися явища йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слізотеча, слиновиділення, висипи на шкірі, м'язова слабкість, загальмованість).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші форми взаємодії.

Не застосовувати одночасно з розчином перекису водню та іншими дезінфікуючими засобами.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 г у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.