

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПУСТИРНИКА ТРАВА
(LEONURI HERBA)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: пустирника трава.

Лікарська форма. Трава різано-пресована.

Шматочки циліндричної форми, поверхня гладенька, блискуча, зрідка матова, мармурова, на торцях нерівна. Колір темно-зелений.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.

Фармакотерапевтична група. Снодійні та седативні засоби. Код АТС N05C M.

Біологічно активні речовини препарату чинять виражені седативні, спазмолітичні, гіпотензивні, кардіотонічні властивості; уповільнюють серцевий ритм, підвищують силу серцевих скорочень, одночасно знижуючи потребу серцевого м'яза у кисні.

Показання для застосування.

Артеріальна гіпертензія легкого ступеня; надмірна нервова збудливість; неврози та неврозоподібні стани (у складі комплексної терапії).

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Артеріальна гіпотензія, брадикардія.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосовувати після консультації лікаря, який повинен оцінити співвідношення користі/ризиків для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

З обережністю слід застосовувати препарат при керуванні транспортом або роботі з іншими механічними засобами через можливе виникнення сонливості та запаморочення.

Діти. Застосовують препарат дітям старше 5 років за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози.

1 столову ложку трави різано-пресованої помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплом вигляді 3-4 рази на добу за 15-20 хв до їди: дорослим та дітям старше 14 років – по

1 столовій ложці, дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці, 5-10 років – по 1 чайній ложці. Перед застосуванням настій збовтати. Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування.

При передозуванні можливі підвищена втомлюваність, сонливість, запаморочення, зниження артеріального тиску. Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри), кишкові розлади, підвищена втомлюваність, сонливість, запаморочення.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При одночасному застосуванні може посилювати дію етанолу, седативних або снодійних засобів, серцевих глікозидів, анагетичних, антигіпертензивних препаратів.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Упаковка.

По 100 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.