

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
ЕСПОЛ

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г мазі містить перцю стручкового екстракт густий (*Extractum Capsici annui spissum*) 100 мг, (5,55:1) (екстрагент – етанол 80 %), у перерахуванні на суму капсаїциноїдів 1 мг; диметилсульфоксид 30 мг;

допоміжні речовини: олія коріандрова, олія лавандова, хлороформ, ланолін, парафін білий м'який, парафін жовтий м'який.

Лікарська форма. Мазь.

Мазь від світло-коричневого до червонувато-коричневого кольору однорідної консистенції зі слабким специфічним запахом.

Назва і місце знаходження виробника.

ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».

61010, Україна, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, які застосовують місцево при суглобовому і м'язовому болю. Препарати стручкового перцю і подібні засоби. Код АТХ M02A B.

Еспол чинить анагезивну, відволікаючу, зігріваючу, розсмоктувальну, протизапальну та місцевопідразнювальну дію. Лікувальний ефект зумовлений комплексною дією компонентів, що входять до складу препарату. Капсаїцини екстракту перцю стручкового чинять сильну місцевопідразнювальну дію на чутливі рецептори шкіри; диметилсульфоксид чинить анагезуючу та протизапальну дію, проявляє помірну фібринолітичну активність, препарат підсилює проникнення крізь непошкоджену шкіру і слизові оболонки лікарських засобів, сприяє глибшому проникненню лікарської речовини, що застосовується разом із ним; олія коріандрова чинить загальнозміцнювальну і тонізуючу дію; олія лавандова проявляє слабкозаспокійливі і спазмолітичні властивості. Компоненти мазі спричиняють рефлекторне розширення дрібних судин і покращують кровопостачання у вогнищі болю, у результаті чого посилюється дренаж цієї ділянки і відбувається видалення продуктів запалення. Ефект спостерігається через 10 – 15 хвилин після застосування препарату і досягає максимуму через 30 хвилин. Тривалість знеболення від 30 хвилин до 2 годин.

Показання для застосування.

Міозит, травми без порушення цілісності шкіри, розтягнення і розрив м'язів, невралгія, люмбаго, попереково-крижовий радикуліт, переломи.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату, бронхіальна астма, ниркова, печінкова недостатність, недостатність кровообігу, глаукома, катаракта, стенокардія, інсульт, вагітність, період годування груддю, дитячий вік до 12 років, ушкодження, порушення цілісності шкіри, відкриті рани, екземи, активна стадія будь-якого запального процесу, гнійні захворювання шкіри.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не допускати попадання мазі на пошкоджену шкіру, в очі та на слизові оболонки.

Накладення пов'язок можливе лише після всмоктування більшої частини мазі.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не застосовувати у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Застосовувати дітям віком від 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Для зовнішнього застосування дорослим і дітям віком від 12 років.

Стовпчик мазі довжиною 4- 7 см (2- 3 г мазі) легкими втираючими рухами руки наносити тонким шаром на ділянку шкіри розміром з долоню, не допускаючи попадання мазі на пошкоджену шкіру або рану, 2-3 рази на добу.

Тривалість застосування визначає індивідуально лікар і зазвичай становить від 1 до 10 діб. Після нанесення мазі необхідно ретельно вимити руки. Після процедури мазь, що залишилася на шкірі, видаляти серветкою, змоченою мильною водою.

Передозування.

Поява алергічних реакцій, включаючи шкірні висипи, кропив'янку, лущення шкіри.

Лікування: після появи ознак передозування видалити мазь, що залишилася на шкірі, серветкою, змоченою мильною водою, і звернутися до лікаря. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Можливі свербіж, лущення шкіри, гіперемія шкірних покривів в місці нанесення, алергічні реакції, висипання, відчуття тепла та печіння у місці нанесення, поколювання, контактна екзема, ангіоневротичний набряк.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Посилює вірогідність виникнення нейропатії при застосуванні препаратів, що містять суліндак. Не застосовувати мазь одночасно з іншими лікарськими засобами з місцево-підразнювальною дією.

Термін придатності.

3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Мазь по 30 г в тубах № 1.

Категорія відпуску.

Без рецепта.