

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

СТРЕС-ГРАН

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 10 г гранул містять Ignatia 30CH (Ігнації 30CH) 20 мг, Ignatia 1000CH (Ігнації 1000CH) 20 мг, Veratrum album 30CH (Вератрум альбуму 30CH) 20 мг, Gelsemium 30CH (Гельземіуму 30CH) 20 мг, Gelsemium 200CH (Гельземіуму 200CH) 20 мг;

допоміжні речовини: крупка цукрова.

Лікарська форма. Гранули.

Гранули однорідні за кольором, кулеподібної форми, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору, без запаху.

Назва і місцезнаходження заявника.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 76-78.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Грушевського, 19

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Властивості препарату зумовлені поєднанням рослинних компонентів, що входять до його складу. Чинить анксиолітичну та вегетостабілізуючу дію при відсутності седативного ефекту. Зменшує неспокій, відчуття тривоги, страху, напруження. Чинить помірну антидепресивну та протисудомну дію. Не викликає денної сонливості.

Показання для застосування.

У комплексному лікуванні: тривожні стани; неврози, що супроводжуються відчуттям тривоги, небезпеки, неспокою, напруги, погіршенням сну, дратівливістю; тривожно-депресивні стани та невротичні депресії на фоні соматичних захворювань; органічні ураження центральної нервової системи з підвищеною збудливістю, судомною готовністю.

Протипоказання.

Дитячий вік до 1 року. Індивідуальна гіперчутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

У зв'язку з наявністю у складі допоміжної речовини – крупки цукрової – хворим на цукровий діабет перед застосуванням препарату слід проконсультуватися з лікарем.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосування препарату можливо лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Препарат не містить седативних компонентів і не спричиняє денної сонливості, тому не впливає на здатність керувати транспортними засобами.

Діти. Препарат не є призначений дітям віком до 1 року.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим і дітям віком старше 3 років призначають по 5 гранул під язик 1-3 рази на добу курсами по 3-4 тижні з перервою 7 днів.

Гранули слід застосовувати під язик до повного розсмоктування, за 15-20 хвилин до або через 1 годину після їди. При необхідності гранули можна заздалегідь розчинити у невеликій кількості води.

Дітям віком від 1 до 3 років із підвищеною судомною готовністю препарат призначають по 3 гранули, заздалегідь розчинені у невеликій кількості води, 1 раз на добу.

Передозування.

Не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії.

Побічні ефекти.

У поодиноких випадках можливе виникнення алергічних реакцій. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити прийом препарату та обов'язково звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При одночасному застосуванні препарату з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомом має становити не менше 30 хвилин.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка.

По 10 г гранул у пеналі полімерному, у картонній пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.