

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ФЛАДЕКС

Склад:

діюча речовина: г мазі містить фладексау перерахуванні на вміст суми флавоноїдів 200 мг;

допоміжні речовини: парафін білий м'який, пропіленгліколь, кислота стеаринова, емульгатор N-гліцерин (E 218), пропілпарабен (E 216), вода очищена.

Лікарська форма. Мазь.

Основні фізико-хімічні властивості: мазь від світло-коричневого до темно-коричневого кольору зі специфічним запахом.

Фармакотерапевтична група. Дерматологічні засоби. Код АТХ D11A X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Лікарський засіб рослинного походження, містить фладексан – екстракт трави десмодіуму канадського родини бобових.

Препарат проявляє місцеву протизапальну, знеболювальну та протисвербіжну дію, має антиалергічні та десенсібілізуючі властивості, проявляє противірусну активність відносно вірусів лишаю (герпесу звичайного) і оперізувальних (Herpes simplex, Herpes zoster) також стимулює репаративні процеси шкіри.

Фармакокінетика.

При нанесенні на шкіру компоненти мазі не виявляються у сироватці крові.

Клінічні характеристики.

Показання.

Місцеве лікування усіх форм і стадій псоріазу, алергічного, атопічного (особливо у підгострий період і у період згасання процесу), періорального та себореїного дерматитів, нейродерміту, фотодерміту, токсидермії, а також лишаю пухирчастого (герпесу) різної локалізації (губної, щічної, носової, вушної, генітальної) та оперізувального лишаю.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Дані відсутні.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат можна застосовувати у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Лікування препаратом не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози.

Застосовувати дорослим і дітям зовнішньо, місцево.

Дерматити різного походження, пухирчастий (герпес) і оперізувальний лишаї. Мазь наносити тонким шаром, злегка втираючи, на уражену ділянку шкіри 2 -4 рази на добу, бажано з моменту появи перших ознак захворювання. Тривалість курсу лікування – 5 -14 днів.

Псоріаз. Мазь наносити на уражену ділянку шкіри під восковий папір 1 -2 рази на добу. Курс лікування – 10 -30 днів і більше, особливо у разі великопляшкових форм.

Залежно від результатів терапії та у випадках рецидивів курс лікування препаратом можна повторювати 2 -3 і більше разів.

Діти.

Препарат можна застосовувати дітям.

Передозування.

Випадки передозування не описані.

Побічні реакції.

У деяких випадках можлива поява печіння, яке зникає після тимчасового припинення застосування препарату. В осіб із підвищеною чутливістю до компонентів препарату можливі алергічні реакції (можливо, уповільнені, у зв'язку з наявністю у складі препарату метилпарабену (E 218) і пропілпарабену (E 216)). Пропіленгліколь може спричинити подразнення шкіри.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2 °С до 8 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 10 г або 15 г у тубі в коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22.