

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**М'ЯТНІ ТАБЛЕТКИ**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* 1 таблетка містить олії м'яти перцевої (в перерахуванні на 50 % ментол) 0,0025 г;  
*допоміжні речовини:* тальк, кальцію стеарат, крохмаль картопляний, цукор кондитерський.

**Лікарська форма.** Таблетки по 0,0025 г.

Таблетки білого кольору, солодкого прохолодного смаку із запахом олії м'яти перцевої.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ТОВ «Тернофарм».  
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.  
Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>.

**Фармакотерапевтична група.** Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту.

Код АТХ А04А D.

М'ятні таблетки, стимулюючи чутливі рецептори слизових оболонок ротової порожнини та шлунка, рефлексним шляхом послаблюють відчуття нудоти і попереджують блювання, а також чинять помірну спазмолітичну, заспокійливу та жовчогінну дію.

**Показання для застосування.**

Нудота, блювання, спазми гладеньких м'язів шлунково-кишкового тракту, відчуття гіркоти у роті.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Спазмofilія, бронхіальна астма, цукровий діабет. Дитячий вік до 3 років.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Пацієнтам зі шлунково-стравохідним рефлюксом (печією) слід уникати застосування препарату, оскільки може збільшитися печія.

**Особливості застосування.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Вагітним жінкам лікування призначає лікар за умови, якщо передбачувана користь для жінки перевищує потенційний ризик для плода. При необхідності застосування препарату у період годування груддю слід припинити годування.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Препарат загалом не впливає на здатність керувати автотранспортом та працювати з іншими механізмами. У разі появи ознак побічної дії препарату (див. «Побічні ефекти») необхідно утриматися від керування автотранспортом.

**Діти.**

Не застосовувати дітям віком до 3 років.

**Спосіб застосування і дози.**

Призначати по 1-2 таблетки під язик.  
Максимальна добова доза для дорослих і дітей віком від 12 років – 8-10 таблеток.  
Для дітей віком від 3 до 12 років – 3-5 таблеток на добу.  
Курс лікування залежить від досягнутого терапевтичного ефекту.

**Передозування.**

Нераціональне застосування препаратів м'яти може призвести до болю у ділянці серця.

**Побічні ефекти.**

Біль у ділянці серця; алергічні реакції, у тому числі гіперемія, висипи, свербіж, набряк шкіри, кропив'янка, дерматит; в окремих випадках – запаморочення. При появі побічних реакцій припинити застосування препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не виявлена.

**Термін придатності.**

2 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.  
Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

Таблетки по 0,0025 г № 10 у блістері.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.