

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

СПИРТ КАМФОРНИЙ

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: камфора рацемічна;

100 мл розчину містять камфори рацемічної 10 г ;

допоміжна речовина: етанол 70 %.

Лікарська форма. Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий .

Прозора безбарвна рідина із специфічним запахом камфори.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ «Фармацевтична фабрика «Віола».

Україна, 69063, м . Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.

Код АТС M02A X10.

Препарат чинить протимікробну, знеболювальну, протизапальну, подразнювальну дію.

Показання для застосування.

Зовнішньо – при запальних процесах (артрит, міозит, артралгія, міалгія, ішіас), для запобігання пролежням.

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість. Виразково-некротичні захворювання шкіри, схильність до судомних реакцій.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не допускати потрапляння препарату в очі.

Не допускати потрапляння препарату на слизові оболонки. При випадковому потрапленні слід змити препарат великою кількістю проточної води.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Не застосовують дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Камфорний спирт застосовують у дорослих зовнішньо для розтирань при наведених патологічних процесах. Розтирають шкіру 2-3 рази на добу.

Тривалість лікування визначається індивідуально.

Передозування.

Посилення побічних реакцій. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Можливі прояви алергічних реакцій, висипи, кропив'янка, подразнення шкіри, головний біль, запаморочення.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не виявлена.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 40 мл у флаконі. По 1 флакону у пачці або без пачки.

Категорія відпуску. Без рецепта.