

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

МАГНІЮ СУЛЬФАТ

Лікарський засіб:

Лактатна сіль: магнію сульфат гептагідрат;
1 пакет містить магнію сульфату гептагідрату 10 г або 25 г;
1 контейнер містить магнію сульфату гептагідрату 25 г.

Форми випуску. Порошок.

Білий кристалічний порошок білого кольору або блискучі безбарвні кристали.

Місце виробництва.

АТ Фармацевтична фабрика «Віола».
Київ, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакологічна група.

Осмотичні проносні засоби. Код АТС А06А D04.

Застосування всередину призводить до проносного ефекту. Препарат має також жовчогінну та сечогінну дію.

Осмотичний ефект обумовлений зміною осмотичного тиску, затримкою всмоктування води із кишечника, розрідженням і збільшенням об'єму кишкового вмісту, подразненням сенсорних рецепторів, що сприяє полегшенню акта дефекації.

Показання для застосування.

Отруєння. Як антидот при отруєнні солями барію.

Протипоказання.

Знижена індивідуальна чутливість, гострі запальні захворювання шлунково-кишкового тракту, кишкова непрохідність, жовчокам'яна хвороба, обструкція жовчовивідних шляхів, вагітність, вагітні стани, артеріальна гіпотензія, стани, пов'язані з дефіцитом кальцію та пригніченням дихального центру, тяжка форма ниркової недостатності.

Заходи безпеки при застосуванні.

Препарат не рекомендується застосовувати систематично.

Важливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат протипоказаний у період вагітності.

У період грудного годування застосовувати під контролем лікаря у разі, якщо користь для матері переважає ризик для дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Застосовують дітям старше 6 років тільки за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози.

Осмотичний засіб магнію сульфат призначати всередину (на ніч або натщесерце за 30 хвилин до їди) 1 раз на добу: дорослим – по 10-30 г в 1/2 склянки води, дітям старше 12 років – по 10 г в 1/2 склянки води, дітям віком 6-12 років призначати від 5 до 10 г (тобто від половини до цілого об'єму розчину приготованого із розрахунку 10 г на 1/2 склянки води).

При хронічному запорі застосовувати у клізмах – вміст 1 пакета (10 г) розчинити у 500 мл води та застосовувати у кількості, призначеній лікарем.

При отруєнні розчинними солями барію призначати дорослим всередину 20-25 г порошку, розчиненого у 200 мл води.

Передозування.

При передозуванні можуть спостерігатися діарея, блювання.

Лікування: внутрішньовенне введення розчину кальцію хлориду або кальцію глюконату – по 5-10 мл 10 % розчину, проводять оксигенотерапію, вдихання карбогену, штучне дихання, перитонеальний діаліз або гемодіаліз. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

При зловживанні вагітності, загострення запальних процесів у шлунково-кишковому тракті, нудота, блювання, алергічні реакції. У разі тривалого застосування можливе порушення водно-сольового обміну, порушення харчування організму, атонія товстого кишечника.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Знижує ефект пероральних антикоагулянтів, серцевих глікозидів, феногіазинів. Знижує абсорбцію ципрофлоксацину, тетрациклінів, послаблює дію стрептоміцину та тобраміцину.

Лактатна сіль не сумісна (утворюється осад) з препаратами кальцію, етанолом (у високих концентраціях), карбонатами, гідрокарбонатами і фосфатами лужних металів, солями азотистої кислоти, барію, стронцію, кліндаміцину фосфатом, гідрокортизону натрію сукцинатом, поліміксину В сульфатом, прокаїну гідрохлоридом, саліцилатами та тартратами.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

10 г або по 25 г у пакетах, по 25 г у контейнерах.

Категорія відпуску. Без рецепта.