

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ПОЛИНУ ГІРКОГО ТРАВА
(HERBA ARTEMISIAE ABSINTHII)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: трава полину гіркого.

Лікарська форма. Трава.

Квіткові корзинки, шматочки стебел та листків різноманітної форми, що проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір сірувато-зелений. Запах ароматний, свіжий, сильний. Смак пряно-гіркий.

Назва і місцезнаходження виробника.
ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група. Засоби для підвищення апетиту. Код АТС А15.

Біологічно активні речовини препарату збуджують апетит, стимулюють функцію залоз органів травлення, підвищують секрецію жовчі, панкреатичного і шлункового соків, чинять протизапальну, антисептичну дію.

Показання для застосування.

Для підвищення апетиту і покращання секреторної діяльності органів травлення при гастритах із пониженою секреторною функцією шлунка; у складі комплексної терапії холециститів, дискінезій жовчних шляхів.

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, жовчокам'яна хвороба; наявність в анамнезі кровотеч із органів малого таза; анемія; епілепсія.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказано (препарат підвищує тонус матки).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат застосовують дітям від 5 років за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози.

2 чайні ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплом вигляді за 30 хв до їди: дорослим та дітям від 14 років – по 1 столовій ложці 3-4 рази на добу, дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці 3 рази на добу, 5-10 років – по 1 чайній ложці 3 рази на добу.

Курс лікування – 2-3 тижні. За призначенням лікаря курс можна повторювати. Між курсами обов'язкові перерви до 2 місяців.

Передозування.

При тривалому застосуванні можливі атонічні запори. Прийом у підвищених дозах, особливо тривалий, може призвести до отруєння – розвитку судом, галюцинацій та викликати так звану «полинну» епілепсію. Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти.

Можливі реакції підвищеної чутливості (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж), нудота, блювання. При появі побічних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.

Упаковка.

По 50 г у пакети з вкладанням у пачку.

Категорія відпуску. Без рецепта.