

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ПРОСТАТОН
(PROSTATON)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 10 г гранул містять Clematis 50CH (Клематису 50CH) 20 мг, Argentum nitricum 30CH (Аргентуму нітрикуму 30CH) 20 мг, Thuja 30CH (Тїї 30CH) 20 мг, Selenium 50CH (Селену 50CH) 20 мг, Pareira brava 30CH (Парейри брави 30CH) 20 мг;

допоміжні речовини: крупка цукрова.

Лікарська форма. Гранули.

Гранули однорідні за кольором, кулеподібної форми, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору, без запаху.

Назва і місцезнаходження заявника.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілька».

Україна, 04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 76-78.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілька».

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Грушевського, 19

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості препарату зумовлені поєднанням мінеральних та рослинних компонентів, що входять до складу препарату. Виявляє протизапальну, діуретичну дію, регулює тонус та перистальтику нижніх відділів сечовивідного тракту, зменшує проникність судин.

Показання для застосування.

Запальні захворювання передміхурової залози; простатит; дизуричні розлади у чоловіків (у тому числі при аденомі простати, циститі, простатиті).

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Хворим на цукровий діабет перед застосуванням препарату слід проконсультуватися з лікарем.

При поєднанні з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомом має становити не менше 30 хв.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не застосовується.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти. Не застосовують дітям.

Спосіб застосування та дози. Чоловікам призначають по 5 гранул під язик 1 раз на добу курсами по 3 місяці з перервою у 7 днів. Гранули приймати під язик, до повного розсмоктування, за 15-20 хвилин до або через годину після їди.

Передозування. Не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії.

Побічні ефекти. У поодиноких випадках можливі алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Можна комбінувати з іншими лікарськими засобами та методами лікування. При аденомі простати можна призначати як допоміжний засіб до основної терапії гомеопатичним препаратом «Аденома-гран».

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. По 10 г гранул у пеналі полімерному, у картонній пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.