

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЕЛЕКАСОЛ
(AELECASOLUM)

Склад лікарського засобу:

дючи речовини: 1 г збору містить: причепи трави 0,1 г , ромашки квіток 0,1 г , солодки коренів 0,2 г , шавлії листя 0,2 г , евкаліпта прутовидного листя 0,2 г , календули квіток 0,2 г .

Лікарська форма. Збір.

Суміш шматочків різної форми сіро-зеленого кольору з оранжево-жовтими, білими і коричневими вкрапленнями; запах ароматний.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ «Ліктраві»

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21

Фармакотерапевтична група. Антисептичні і дезінфікуючі засоби. Код ATC D08A X.

Компоненти препарату чинять антимікробну дію відносно стафілокока, кишкової та синьогнійної паличок, вульгарного протею, пухнастого мікроспорому та деяких інших мікроорганізмів; виявляють протизапальні властивості і стимулюють репаративні процеси.

Показання для застосування.

У комплексній терапії гострих і хронічних захворювань вуха, горла та носа; запальних захворювань ротової порожнини та травного тракту.

Протипоказання.

Гіперчутливість до компонентів препарату. Артеріальна гіpertenzія; порушення функції печінки або нирок; гіпокаліємія, тяжкий ступінь ожиріння.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

З обережністю застосовують хворим міокардитом, перикардитом, інфарктом міокарда, брадикардією.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

За призначенням лікаря, якщо користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Препарат застосовують дітям від 3 років.

Способ застосування та дози.

2 столові ложки збору помістити в емальованій посуд, залити 200 мл гарячої кип'ячені води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченю водою до 200 мл. З астосову вати місцево для полоскання, примочок, мікроклізм, зрошень та інгаляцій у розведеному вигляді (перевареною водою у 3-4 рази). Внутрішньо приймати нерозведеній настій у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям старше 14 років – по 1/3 склянки; дітів віком 3-7 років – по 1 столовій ложці, 7-12 років – по 2 столові ложки, 12-14 років – по 1/4 склянки. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляній або емальованій посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям старше 14 років – по 1 склянці, дітям віком 3-7 років – по 1/4 склянки, 7-12 років – по 1/2 склянки, 12-14 років – по 2/3 склянки. Місцево настій застосовувати для полоскання, примочок, мікроклізм, зрошень та інгаляцій.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування.

Тривале застосування (більше 2 місяців) може викликати порушення водно-електролітного балансу.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції (у т.ч. висипання, свербіж, гіперемія шкіри, утворення набряків), підвищення артеріального тиску, гіпокаліємія. Прияві побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Одночасне застосування разом із серцевими глікозидами, антиаритмічними препаратами (хінідин), тіазидними та петлевими діуретиками, адренокортикостероїдами та проносними засобами може посилити гіпокаліємію.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °C. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Упаковка.

По 60 г, 75 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах в упаковці № 20.

Категорія відпуску. Без рецепта.