

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПИЖМА КВІТКИ
(TANACETI FLORES)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: пижма квітки.

Лікарська форма. Квітки.

Подрібнена сировина: цілісні квіткові кошики, окремі трубчасті квітки, квітколожа і їх шматочки, шматочки квітконосів; колір жовтий, бурувато-зелений, світло-зелений;

порошок крупний: суміш шматочків квітколож, квітконосів, цілісних або подрібнених трубчастих квіток; колір жовтий, бурувато-зелений, світло-зелений.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при біліарній патології

Код АТС А05 АХ.

Біологічно активні речовини препарату чинять жовчогінну, протимікробну, протиглистну, фітонцидну, в'язучу та протизапальну дію.

Показання для застосування. Аскаридоз, гострики; захворювання печінки та жовчовивідних шляхів (холецистити, ангіохоліти); шлунково-кишкові захворювання (гастрити зі зниженою кислотністю, коліти, ентероколіти).

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до препарату. Гепатити, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат не застосовувати дітям.

Спосіб застосування та дози. 1 столову ложку квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді за 15 хв до їди: дорослим – по 1 столовій ложці 3-4 рази на добу. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді за 15 хв до їди: дорослим – по 2 столові ложки 3-4 рази на добу.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. Диспептичні розлади, блювання, в тяжких випадках – судом.

Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти. Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.

Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Упаковка.

Подрібнена сировина по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом; *порошок крупний* по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20 у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.