

**I Н С Т Р У К Ц І Я**  
для медичного застосування лікарського засобу  
**СОЛОДКИ КОРЕНІ**  
**(GLYCYRRHIZAE RADICES)**

**Склад:**

дюча речовина: солодки корені (*Glycyrrhizae radices*);  
1 пачка містить: солодки коренів (*Glycyrrhizae radices*) 50 г або 100 г ;  
1 фільтр-пакет містить: солодки коренів (*Glycyrrhizae radices*) 1,5 г.

**Лікарська форма.** Корені.

**Основні фізико-хімічні властивості:** шматочки волокнистих коренів різної форми світло-жовтого, жовтого, бурувато-жовтого кольору з коричнювато-сірими, коричневими вкрапленнями.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Код ATХ R05C A.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.**

Біологічно активні речовини коренів проявляють відхаркувальні та обволікаючі властивості, що пом'якшують кашель; чинять сечогінну, протизапальну, спазмолітичну, антигістамінну, противиразкову дію .

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Захворювання дихальних шляхів (бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма, бронхеоктатична хвороба), запальні захворювання нирок і сечового міхура (піеліти, піелонефрити, цистити), виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишki (у складі комплексної терапії).

**Протипоказання.**

Гіперчутливість до біологічно активних компонентів препарату. Органічні ураження серця (міокардит, перикардит, інфаркт міокарда), артеріальна гіpertenzія; порушення функції печінки та нирок; гіпокаліємія; тяжкий ступінь ожиріння.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Одночасне застосування разом із серцевими глікозидами, антиаритмічними препаратами (хінідин, тіазидними та петльовими діуретиками, адренокортикостероїдами та проносними засобами може посилити гіпокаліємію.

**Особливості застосування.**

Не рекомендується застосовувати препарат протягом тривалого часу.

**Застосування у період вагітності або годування грудлю.** Протипоказано.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.** Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

1 столову ложку коренів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі 10 хв., процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об 'ем відвару довести кип'ячену водою до 200 мл. Приймати у теплом угляді за 30 хв. до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1-2 столові ложці 3-4 рази на добу, дітям віком 12-14 років – по 1 столовій ложці 2-3 рази на добу, 5-12 років – по 1 десертній ложці 3-4 рази на добу, 3-5 років – по 1 десертній ложці 2-3 рази на добу, 1-3 роки – по 1 чайній ложці 2-3 рази на добу. Перед застосуванням відвар збовтати.

3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настояти 15-20 хв . Приймати у теплом угляді за 30 хв . до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по ½ склянки 3-4 рази на добу, дітям віком 12-14 років – по 2 столові ложки 2-3 рази на добу, 5-12 років – по 1 столовій ложці 3-4 рази на добу, 3-5 років – по 1 столовій ложці 2-3 рази на добу, 1-3 роки – по 1 десертній ложці 2-3 рази на добу.

Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.

**Діти.** Застосування препарату рекомендується дітям віком від 1 року.

**Передозування.** Передозування та тривале застосування (більше 2 місяців) може спричинити порушення водно-електролітного балансу, у результаті чого можливий розвиток гіпокаліємічної міопатії та міоглобінурії. Можливе посилення побічних ефектів.

**Побічні реакції.** Підвищення артеріального тиску, гіпокаліємія, алергічні реакції (у тому числі висипання, свербіж, гіперемія шкіри, утворення набряків). При появі побічних реакцій препарат необхідно відмінити та звернутися до лікаря .

**Термін придатності.** 5 років. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °C у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 50 г або по 100 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник/заявник.** ПрАТ «Ліктрави», Україна.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місцезнаходження заявника.**  
Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.