

I Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування лікарського засобу
ХВОЩА ПОЛЬОВОГО ТРАВА
(EQUISETI ARVENSIS HERBA)

Склад:

діюча речовина: хвоща польового трава (*Equiseti arvensis herba*);
1 пачка містить: хвоща польового трави (*Equiseti arvensis herba*) 50 г;
1 фільтр-пакет містить: хвоща польового трави (*Equiseti arvensis herba*) 1,5 г.

Лікарська форма. Трава.

Основні фізико-хімічні властивості: шматочки стебел та листя від світло-зеленого до зеленувато-сірого кольору, іноді з коричневими вкрапленнями.

Фармакотерапевтична група. Діуретичні препарати. Код ATX C03B X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини препарату чинять сечогінну, кровоспинну, протизапальну, antimікробну і гіпотензивну дію. Експериментально встановлено, що настої з хвоща польового трави сприяють виведенню свинцю з організму.

Клінічні характеристики.

Показання.

Серцеві та інші захворювання, що супроводжуються набряками; захворювання сечовивідних шляхів (піеліти, цистити, уретрити); легеневі, носові, маткові і геморойальні кровотечі; гострі та хронічні отруєння свинцем (у складі комплексної терапії).

Протипоказання.

Нефрити, нефрози, нефрозонефрити. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

2 столові ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'ячені води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'ячену водою до 200 мл. Перед прийомом настій збагатити.

Приймати у теплом у вигляді 3-4 рази на добу через 1 годину після їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по $\frac{1}{4}$ склянки, дітям віком 12-14 років – по 2 столові ложки.

2 фільтр-пакети помістити у скляній або емальованій посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплом у вигляді 3-4 рази на добу через 1 годину після їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по $\frac{1}{2}$ -1 склянці, дітям віком 12-14 років – по $\frac{1}{2}$ склянки.

Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8 -15 °C не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.

Діти. Препарат призначати дітям віком від 12 років.

Передозування. Повідомлення відсутні.

Побічні реакції.

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, свербіж та висипання на шкірі). Може спричинити подразнення тканини нирок, що проявляється болем у попереку та наприкінці сечовивипускання. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності. 4 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник. ПрАТ «Ліктрави», Україна.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місцезнаходження заявника.

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.