

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ВЕС-НОРМА

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 10 г гранул містять Sulfur 30 CH (Сульфур 30 CH) 20 мг, Fucus vesiculosus 30 CH (Фукусу везикулозусу 30 CH) 20 мг, Ammonium carbonicum 200 CH (Амоніуму карбонікуму 200 CH) 20 мг, Cimicifuga 200 CH 20 мг (Циміцифуги 200 CH) 20 мг, Lycopodium 1000 CH (Лікоподіюму 1000 CH) 20 мг;

допоміжні речовини: крупка цукрова.

Лікарська форма. Гранули.

Гранули однорідні за кольором, кулеподібної форми, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору, без запаху.

Назва і місцезнаходження заявника.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 04050, м . Київ, вул. Тургенєвська, 76-78.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Грушевського, 19.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості препарату зумовлені поєднанням рослинних та мінеральних компонентів, що входять до складу препарату. Здійснює анорексигенну дію, сприяє нормалізації метаболізму йоду, жирів, впливає на вуглеводний та білковий обмін.

Показання для застосування.

Підвищений апетит, постійне відчуття голоду; корекція надлишкової маси тіла (у складі комплексної терапії); ожиріння (у складі комплексної терапії на початкових стадіях у пацієнтів молодого та середнього віку).

Протипоказання.

Дитячий вік до 12 років. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При захворюваннях ендокринної системи підліткам, особам літнього віку препарат застосовувати з особливою обережністю, за призначенням та під наглядом лікаря.

Обов'язкове дотримання дієти, обмеженої у калоріях, активний руховий режим. Хворим на цукровий діабет застосовувати препарат можна, лише проконсультувавшись із лікарем.

При поєднанні з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомом має становити не менше 30 хв.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Жінкам у періоди вагітності або годування груддю перед застосуванням препарату необхідно проконсультуватися з лікарем, який має оцінити співвідношення користі для матері та потенційного ризику для плода.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти. Не призначати дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим та дітям старше 12 років призначають по 5 гранул під язик 3 рази на добу. У перші 2 тижні приймати перед кожним прийомом їжі, у подальшому – 1 раз на добу курсами по 2-3 місяці з перервою 7 днів. Курс лікування – 3 місяці.

Гранули слід приймати під язик до повного розсмоктування за 15-20 хвилин до їди. При необхідності гранули можна заздалегідь розчинити у невеликій кількості води.

Передозування.

Не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії.

Побічні ефекти.

У поодиноких випадках можливі алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Протипоказань для комбінації з іншими фармакологічними засобами немає. Препарат можна комбінувати з будь-якими лікарськими засобами та методами лікування.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка.

По 10 г гранул у пеналі полімерному, у картонній паціці.

Категорія відпуску. Без рецепта.