

**ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату**

КАМЕТОН

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 балон містить хлорбутанолу гемігідрату 0,1 г, камфори рацемічної 0,1 г, левоментолу 0,1 г, олії евкаліптової 0,1 г;

допоміжні речовини: ізопропілміристат, хладон 134a.

Лікарська форма. Аерозоль.

Прозора, безбарвна або злегка жовтуватого кольору рідина зі специфічним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

АТ «Стома». Україна, 61105, м. Харків, вул. Ньютона, 3.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що діють на респіраторну систему. Антисептики.

Код АТС R02A A20.

Чинить протизапальну, антисептичну і легку місцевознеболювальну дію. У механізмі дії відіграє роль рефлекторна реакція (подразнення чутливих нервових закінчень) і стимуляція утворення і вивільнення ендорфінів та інших біологічно активних ендогенних речовин, що регулюють больові відчуття і проникність судин. Комбіноване поєднання хлорбутанолгідрату, камфори та олії евкаліптової чинить протизапальну та дезінфекційну дію, полегшує відокремлення в'язкого секрету, що накопичується у верхніх відділах дихальних шляхів. Ментол діє як м'який місцевоанестезуючий агент, має дезодораційний ефект.

Показання для застосування.

Гострі і хронічні (переважно у стадії загострення) запальні захворювання носа, глотки і гортані.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Дитячий вік до 5 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не розпилювати поблизу вогню. Препарат слід з обережністю застосовувати дітям, оскільки можливий розвиток бронхоспазму. Лікування дітей слід проводити під наглядом лікаря.

Перед застосуванням Каметону ротову порожнину слід прополоскати теплою кип'яченою водою. При опіках з уражених ділянок стерильним тампоном зняти некротичний наліт. Балон з препаратом не розбирати і не давати дітям, оберігати від ударів. Після застосування препарату на розпилювач надіти захисний ковпачок, щоб запобігти його забрудненню. При уприскуванні у ніс не закидати голову і не перевертати балон. Не рекомендується користуватися одним і тим же балоном кільком особам, щоб уникнути поширення інфекції. Під час розпилювання препарату слід уникати попадання в очі. Перед застосуванням препарату особам, схильним до алергії, слід обов'язково проконсультуватися з лікарем.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказань до застосування препарату у період вагітності або годування груддю не виявлено.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не встановлена.

Діти. Препарат застосовують дітям віком від 5 років під наглядом лікаря.

Спосіб застосування та дози.

Препарат призначають дорослим і дітям віком старше 5 років. Для застосування препарату необхідно з розпилювача зняти захисний ковпачок, потім розпилювач вводять у порожнину носа на глибину 0,5 см або рота і натискають на основу розпилювача до упору. Вміст балона при цьому розпилюється у дрібнодисперсному стані. За 1 натиск розпилюється 0,1 г препарату, який містить сумарно 1,33 мг діючих речовин.

Каметон слід розпилювати у порожнину носа або рота на фазі вдиху. За 1 сеанс інгаляції здійснити 2-3 розпилювання. Частота інгаляції зазвичай становить 3-4 рази на добу.

Тривалість лікування безперервно становить 6-7 діб. Препарат не слід застосовувати довше 2 тижнів.

Передозування. Не описано.

Побічні ефекти.

Іноді можуть виникати реакції, зумовлені підвищеною індивідуальною чутливістю до компонентів препарату з боку слизової оболонки горла (відчуття сухості, першіння або печіння), набряк у місці контакту, сухість слизової оболонки носа, задишка, набряклість обличчя, язика, шкірні висипання, кропив'янка, свербіж.

При виникненні будь яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 40 °С. Охороняти від падінь, ударів, впливу прямих сонячних променів.

Упаковка.

По 30 г у балонах аерозольних алюмінієвих з клапанами дозуючої дії, розпилювачами та захисними ковпачками.

Категорія відпуску. Без рецепта.