

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

НІЗОРАЛ®
(NIZORAL®)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: ketoconazole;

1 г шампуню містить 20 мг кетоконазолу ;

допоміжні речовини: натрію лаурил ефір сульфат, динатрію монолаурил ефір сульфосукцинат, діетаноламід жирної кокосової кислоти, колаген тваринний лауридимонієвий гідролізований, макроголу 120-метилглюкози діолеат, натрію хлорид, кислота хлористоводнева концентрована, імідосечовина, букет парфумний, натрію гідроксид, натрію еритрозин (E 127), вода очищена.

Лікарська форма. Шампунь.

В'язка прозора рідина рожевого кольору з трав'яним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

Янссен Фармацевтика Н.В., Бельгія/ Janssen Pharmaceutica N.V., Belgium.

Янссен Фармацевтика Н.В., Турнхютсегев 30, В-2340 Беерсе, Бельгія/

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, В-2340 Beerse, Belgium.

Фармакотерапевтична група. Протигрибкові засоби для місцевого застосування. Похідні імідазолу та триазолу.

Код АТХ D01A C08.

Кетоконазол – це синтетична похідна імідазолдіоксолану, що має фунгіцидну та фунгістатичну активність щодо дерматофітів, таких як *Trichophyton sp.*, *Epidermophyton sp.*, *Microsporum sp.*, і дріжджів, таких як *Candida sp.* та *Malassezia furfur (Pityrosporum ovale)*. Шампунь з кетоконазолом швидко зменшує лущення та свербіж, котрі часто асоціюються з лупою, себорейною екземою та висівкоподібним лишаєм.

Після місцевого застосування шампуню Нізорал® вміст кетоконазолу у плазмі крові не визначається. Плазмові рівні після місцевого застосування шампуню Нізорал® визначалися після нанесення на всю поверхню тіла.

Показання до застосування.

Лікування та профілактика уражень шкіри та волосся, що спричинені дріжджовими мікроорганізмами *Malassezia* (попередня назва *Pityrosporum*), таких як лупа, висівкоподібний лишай (локальний), себорейний дерматит.

Протипоказання.

Нізорал® шампунь протипоказаний при наявності гіперчутливості до будь-якого з його компонентів.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При використанні шампуню слід уникати попадання препарату в очі. При попаданні в очі їх слід промити водою.

Для попередження синдрому відміни при тривалому місцевому лікуванні кортикостероїдами рекомендується продовжувати місцеве застосування кортикостероїдів у поєднанні з шампунем Нізорал® з наступною поступовою відміною кортикостероїдів протягом 2-3 тижнів.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Належні та добре контрольовані дослідження у вагітних жінок та матерів, які годують груддю, не проводилися. Після місцевого застосування на шкірі шампуню Нізорал® у невагітних жінок концентрація кетоконазолу у плазмі крові не визначалася. Плазмові рівні після місцевого застосування шампуню Нізорал® визначалися після нанесення на всю поверхню тіла. У зв'язку з відсутністю відомих факторів ризику застосування препарату під час вагітності та у період годування груддю не протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами

Нізорал® шампунь не впливає на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами.

Діти. Досвід застосування шампуню Нізорал® дітям відсутній.

Спосіб застосування та дози.

На уражені ділянки нанести шампунь Нізорал® на 3-5 хвилин, після чого змити водою.

Лікування:

- лупа та себорейний дерматит (себорейна екзема): два рази на тиждень протягом 2-4 тижнів;
- висівкоподібний лишай: щоденно протягом 5 днів.

Профілактика:

- лупа та себорейні дерматити (себорейна екзема): кожен тиждень або 1 раз на два тижні;
- висівкоподібний лишай: щоденно протягом 3 днів (разовий курс лікування) перед початком літнього сезону.

Передозування.

Оскільки препарат призначається тільки для зовнішнього застосування, розвиток передозування не передбачається.

У випадку передозування необхідне лікування полягає у застосуванні підтримуючих та симптоматичних заходів. Для попередження аспірації забороняється викликати блювання або використовувати промивання шлунка.

Побічні ефекти.

Дані клінічних досліджень.

Безпечність шампуню Нізорал® визначалась у 22 клінічних дослідженнях за участю 2890 пацієнтів, яким препарат наносили місцево на шкіру.

Побічні реакції, що виникали у ≥1 % пацієнтів, були відсутніми.

Побічні реакції, що виникли у <1 % пацієнтів:

порушення з боку органа зору: подразнення очей, підвищена сльозотеча;

загальні порушення та реакції на місці застосування: еритема, відчуття дискомфорту, гіперчутливість, подразнення, свербіж, пустульозний висип у місці нанесення;

інфекції та інвазії: фолікуліт;

порушення з боку нервової системи: дисгевзія;

порушення з боку шкіри та підшкірної клітковини: акне, алопеція, контактний дерматит, сухість шкіри, зміна структури волосся, висип, відчуття печіння шкіри, зміни з боку шкіри, посилення лущення шкіри.

Постмаркетинговий нагляд

Побічні реакції при застосуванні шампуню Нізорал®, про які вперше повідомлялося у післярестраційний період, наведені нижче. Частота виникнення побічних реакцій розподілена наступним чином: дуже часті – □1 /10; часті – □1/100 та < 1/10; нечасті – □1/1000 та <1/100; рідкі – □1/10 000 та <1/1000; дуже рідкі – <1/10 000, включаючи окремі повідомлення.

Порушення з боку шкіри та підшкірної клітковини: дуже рідкі – кропив'янка, зміна кольору волосся (в основному у пацієнтів з хімічно ушкодженим або сивим волоссям).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Флакони з поліетилену, що містять 60 мл або 25 мл шампуню. По одному флакону у картонній коробці з інструкцією.

Категорія відпуску. Без рецепта.