

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ПУМПАН[□]

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 100 мл препарату містить Crataegus D1 20 мл, Arnica D6 10 мл, Kalium carbonicum D6 10 мл, Digitalis D12 10 мл, Convallaria D12 10 мл;
допоміжні речовини: етанол 43 % (м/м).

1 мл розчину містить 25 крапель.

Лікарська форма. Краплі оральні.

Прозора від жовтуватого до червонувато-жовтого кольору рідина.

Назва і місце знаходження виробника.

Ріхард Біттер АГ.
Оссіахерштрассе 7, A-9560 Фельдкірхен, Австрія.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний засіб.

Препарат виявляє антиангінальний, метаболічний, кардіотонічний та антигіпертензивний ефекти. Зменшує адренергічну імпульсацію, чинить антиаритмічну, м'яку діуретичну, антиоксидантну та кардіопротекторну дії. Покращує показники ліпідного обміну (рівень холестерину, β-ліпопротеїдів) без додаткового застосування гіполіпідемічних препаратів. Покращує реологічні властивості крові, сприяє зниженню коагуляційного потенціалу плазми та нормалізації рівня фібриногену та протромбінового індексу. Препарат покращує кровообіг, обмінні процеси та живлення серцевого м'яза, підвищує ефективність та економічність роботи серця, сприяє покращенню скорочувальної та насосної функції міокарда, сприяє нормалізації підвищеної артеріального тиску, змінюючи стінки судин і чинить антисклеротичну дію. Пумпан[®] підвищує толерантність до фізичного навантаження внаслідок більш економічної роботи серця та підвищення внутрішньокоронарного резерву.

У комплексному лікуванні Пумпан[®] знижує частоту та інтенсивність нападів стенокардії, змінює серцево-судинну систему, підвищує стійкість серця до фізичного та психоемоційного навантаження, запобігає подальшому розвитку та загостренням хвороби серця. Завдяки комплексній дії включення Пумпану[®] у базисну серцево-судинну терапію зменшує потребу та дозволяє скоротити прийом або дози інших серцево-судинних препаратів (нітратів, β-блокаторів, антигоністів кальцію тощо). У пацієнтів з нестабільною стенокардією, у тому числі рефрактерною до базисної терапії, включення Пумпану[®] у комплексне лікування дозволяє досягнути стабілізації стану хворого.

Покращує адаптаційні можливості осіб із серцево-судинними захворюваннями.

Показання для застосування.

Нейроциркуляторна дистонія, у комплексному лікуванні хронічної ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, дистрофічних змін міокарда, порушень серцевого ритму, серцевої недостатності.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

На початку лікування препаратом можуть з'явитися прояви незначного посилення симптомів захворювання, що не потребують відміни препарату.

Оскільки Пумпан[□] містить рослинні та інші природні компоненти, при зберіганні може спостерігатися незначна зміна смаку, прозорості або кольору розчину, що не призводить до зниження ефективності препарату. При аритміях не слід приймати препарат без консультації з лікарем, оскільки Пумпан[□] може зменшувати ектопічну активність серця (суправентрикулярна та шлуночкова екстрасистоли), а у деяких пацієнтів інколи можуть відзначатися збільшення суправентрикулярних та шлуночкових екстрасистол.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Інформація щодо можливого ризику для плода та дитини від застосування препаратору у період вагітності або годування груддю дотепер відсутня. Препарат застосовують у період вагітності або годування груддю у випадках, якщо, на думку лікаря, очікувана користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автомобілем або роботі з іншими механізмами.

Незважаючи на вміст спирту, препарат у рекомендованих дозах не впливає на здатність керувати транспортними або механічними засобами.

Діти.

Препарат призначають дітям від 5 років.

Способ застосування та дози.

Дорослі та діти від 12 років: 10 крапель препаратору в чистому вигляді або розведеніх в 1 столовій ложці води;

діти 5-12 років: 5-7 крапель препаратору, розведеніх в 1 столовій ложці води;

приймати 3 рази на добу за 30 хвилин до або через 1 годину після вживання їжі.

На початку лікування, а також у випадках, що вимагають швидкого послаблення симптомів, рекомендованій прийом препаратору кожні півгодини-годину до 8 разів на добу до покращання стану, але не більше 3-х діб, почасти чого застосовувати 3 рази на добу.

Для досягнення максимального ефекту рекомендуються приймати Пумпан[□] у проміжках між прийомами їжі (за 30 хвилин до або через 1 годину після їди), потримати препаратор деякий час у роті перед проковтуванням. Триваість курсу лікування – 2 -3 місяці. При стабілізації стану можливий переход на 1 -2 разовий підтримуючий прийом.

Передозування.

Компоненти препаратору знаходяться у дуже високих розведеннях, тому ніяких токсичних або небажаних ефектів не повинно спостерігатися у випадку передозування.

Випадків передозування не було зареєстровано.

Побічні ефекти.

У поодиноких випадках в осіб з гіперчутливістю на будь-який компонент препаратору можливе виникнення алергічних реакцій.

Взаємодія з лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препаратор можна комбінувати з будь-якими лікарськими засобами та методами лікування.

При одночасному застосуванні препаратору Пумпан[®] з іншими серцево-судинними лікарськими засобами прийом або доза препараторів базисної терапії може бути зменшена, але тільки під наглядом лікаря.

Рекомендовано дотримуватися 20-хвилинної перерви між прийомом лікарських засобів.

Термін придатності. 5 років.

Не застосовувати препаратор після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати у ціліно закритому флаконі в оригінальній картонній упаковці при температурі не вище 30 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 20 або 50 або 100 мл у флаконах-крапельницях зі темного скла, у картонній упаковці.

Категорія відпуску. Без рецепта.